

水 稻 除 草 剤 の 散 布 体 系 (例)

(※○数字は農薬成分数です)

	代かき後	-7日	田植移植	+5日	+10日	+15日	+20日	+25日	+30日
〈移植水稻〉									
【一発除草剤】 ・水持ちの良い水田 ・一年生雑草から多年生雑草まで効く			③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒 ③ベンケイ 豆つぶ・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒 ③コメット フロアブル・ジャンボ ③アツパレZ 1キロ粒 ③アツパレZ フロアブル・ジャンボ						
				②ボデーガードプロ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ					
【初期剤＋一発剤】 ・水持ちの悪い水田 ・多年生雑草の多い水田 ・前年一発剤のみで多発生したほ場			①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ①ピラクロン1キロ・フロアブル・ジャンボ ②ショキニー フロアブル・豆つぶ				③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒・フロアブル・ジャンボ ③アツパレZ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ②ボデーガードプロ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ		
	①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ 1キロ粒・フロアブル ①ピラクロン 1キロ・フロアブル				③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒・フロアブル・ジャンボ ③アツパレZ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ②ボデーガードプロ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ				
【初期剤＋中期剤】 ・広葉・後発等の雑草が多発生するほ場は体系処理で対応			①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ①ピラクロン1キロ・フロアブル・ジャンボ ②ショキニー フロアブル・豆つぶ				③ナイスミドル 1キロ粒(※イネが4葉期以降～) ②ワイドショット 1キロ粒		

※田植移植前に除草剤を使用する場合は、7日前までに行いましょう。

	代かき後	-7日	播種	+5日	出芽揃期	イネ1葉期	+20日	+25日	+30日
〈直播水稻〉									
【初期剤＋一発剤】			②プレキープ 1キロ粒・フロアブル ①サンバード 1キロ粒 ①ピラクロン 1キロ粒・フロアブル				③アツパレZ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒		

※播種時の代が柔らかすぎる場合は播種同時散布は行わない。

〈農薬使用上の注意事項〉 農薬の容器や包装ラベルに記載された「適用作物」「使用量・濃度」「使用時期」「使用回数」と「使用方法」を必ず使用前に一読し、適正に使用しましょう。

◎水田にたっぷり水を入れて散布し、処理後は落水・掛け流しをしない。

・薬剤処理前にはネズミ穴などが無いように畦畔を補修し、水尻もしっかり止め、たっぷりの水(4~6cm)を保って散布します。湛水を維持しながら田面水を外に出さないような水管理を行って下さい。

また散布後は7日間は止水し、落水・かけ流しを避けて下さい。処理層をきちり形成し、雑草に薬剤成分をうまく吸収させる為です。