

ハウス育苗管理のポイント


苗の絵は原寸大です

◎播種前に準備すること
1. ハウスピニールを早めに張り、ハウス内を乾かし地温を上げ、地面が均平になるよう整地する（野菜栽培あとは特に）。

2. 稲わら・穀殻は、いもち病の伝染源になるので、育苗ハウス内、近辺への放置や使用をしない。

◎播種適期気温 一日平均気温が10℃に上昇した頃から播種可能です。平坦地では4月中旬頃。

期間	出芽期		緑化期	硬化期
	加温出芽2日程度	無加温出芽3~7日程度		
温度	30℃ 昼30℃ 夜15℃以上 ※細菌性病害の発生を助長するので30℃を上限とする。		2~4日程度 昼25℃~20℃ 夜15℃~10℃	12~14日程度 昼20℃~15℃ 夜15℃~10℃
被覆・換気	①コシヒカリは伸びやすいので短めに終了する。 ②ハウスには朝方出す。 ③乾燥を防ぐため被覆資材を育苗箱下に巻き込む。	①シルバーポリトウとラブシートの二重被覆。 ②夜間や低温時は二重被覆し保温する。 ③第1葉が展開したら硬化期に移す。		①ハウス内の温度管理に十分注意し、中後期は外気温にならす管理をする。 ②田植えの5~7日前から夜間も換気を行う。ただし、8℃以下の低温は避ける。
ハウス管理と苗の生育のポイント	①無加温出芽では、播種時に十分灌水する。 ②出芽揃時に覆土の持ち上がりが見られたら灌水して覆土を沈下させる。 ③播種直後でも晴天時には、換気を行う。	①過湿に注意し、灌水は床土の状態を確認して遅くても午前10時までに実施する。 ②ラブシートは乾きやすいので注意する。 ③出芽・緑化期が長すぎると徒長苗になるので注意する。	【緑化終了時】 ①過湿に注意し、灌水は床土の状態を確認して遅くても午前10時までに実施する。 ②ラブシートは乾きやすいので注意する。 ③出芽・緑化期が長すぎると徒長苗になるので注意する。 【硬化開始】 ①過湿に注意し、灌水は床土の状態を確認して遅くても午前10時までに実施する。 ②ラブシートは乾きやすいので注意する。 ③出芽・緑化期が長すぎると徒長苗になるので注意する。 【硬化終了】 ①過湿に注意し、灌水は床土の状態を確認して遅くても午前10時までに実施する。 ②ラブシートは乾きやすいので注意する。 ③出芽・緑化期が長すぎると徒長苗になるので注意する。	①前半は、1日1回午前中に灌水する。 ②後半は、1日1~2回灌水する。ただし、夕方の灌水はハウス内と苗の温度を下げる所以避ける。 ③老化苗防止と田植え後の活着を早めるために田植えの4~5日前に苗追肥を行いましょう。



障害と対策

【出芽期のカビ予防対策】一出芽期

播種後の被覆期間が長引くとカビが発生しやすくなるので、適期播種を心がける。前年発生したハウスは箱消毒を行う。

【苗ヤケに注意】一出芽期 一葉先等が褐色になる

ハウスの温度は35℃以上にしない。

※新しいビニールは室温が上がりやすいので要注意。

【ばか苗病】一緑化・硬化期 一異常な徒長苗

出芽時の低温に注意。見つけ次第、根ごと抜き取り土に埋めるなどして処分。

【褐条病】一緑化・硬化期 一茎が褐色になる

播種直後10日間の過剰灌水と高温で助長するので注意。

【ムレ苗対策】一緑化・硬化期 一坪状に変化が現れる

pHを5.5以上にしない。薄まきを励行。ピートモスやくん炭を使用し保水性や通水性を確保する。温度の急変(8℃以下 35℃以上)で発生しやすくなる。発生したら早めに田植えをする。

プール育苗のポイント

★落水が速やかに確実にできるよう、苗床は均平にする。

※傾斜が大きい場合は、2~3つにプールを仕切って作る。

★入水開始時期ー緑化終了時(葉齢1~1.2L)

★入水時の水深

①1回目ー入水は床土の高さまでとする。

②2回目以降ー入水時は苗丈の半分以下の深さに。

※苗が水没しないよう注意する。

★ハウス内温度

①慣行育苗より伸びやすい為、入水後は日中・夜間とも、側のビニールを開放する。

※低温注意報が出た場合、又は夜間の気温が5℃以下の時は、側のビニールを閉め、深めに入水し保温する。

★落水時期ー田植えの2~4日前に落水する。

★プール育苗の苗は、低温に対する抵抗力が弱いので、低温時の田植えは避ける。

高品質米づくりのポイント

★ 育苗管理

②0葉の健苗を植えるー早期活着による分けづ促進。※老化苗は活着不良や茎数確保が遅れる。

③べんとう肥の施用ー田植え後の活着を早める。

★ 土づくり

④たい肥の散布ー地力の確保や土壤の团粒化促進。

阿賀野市では、「ゆうきの子」「阿賀のたいひ」の散布経費の一部助成を行っています。

春のたい肥散布につきましては、最寄りのJA等へ相談、申し込み下さい。

⑤鉄・ケイ酸質肥料ー気象変動リスク対策及び、秋落ち防止、品質収量の向上。春の耕起前に施用。

⑥耕起ー耕深は15cmを確保しましょう。作土層を深くすることによって、

根の分布が広がり高温障害に対する抵抗力を高めます。

★ 倒伏防止ー高地力地帯の基肥窒素量(成分)の目安/10a

①化学由来の窒素のみ場合は2kg程度。2. 有機由来の窒素が50%以上の場合は3kg程度。

②基肥ー発肥料を初めての使用や毎年倒伏してほ場では、慣行施用量(基肥+穗肥)より

1~2割減肥しましょう。

★ 畦畔除草ーカメムシ等害虫の住み処をつくらない。