除草剤の散布体系（例）

（※○数字は農薬成分数です。）

＜移植水稲＞

－7日　田植移植　＋5日　＋10日　＋15日　＋20日　＋25日　＋30日

【一発除草剤】

水持ちの良い水田
一年生雑草から多年生雑草まで効く

- ③ウィナー 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③ベンケイ 1キロ粒
- ③ベンケイ 豆つぶ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③コメット 1キロ粒・顆粒
- ③コメット ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ボデーガード 1キロ粒
- ②ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ

※ベンケイ 豆つぶ・ｼﾞｬﾝﾎﾞは＋4日目から散布可能
※コメット ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞは＋5日目から散布可能
※ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞは＋5日目から散布可能

【初期剤＋一発剤】

水持ちの悪い水田
多年生雑草の多い水田

- ①ソルネット 1キロ粒
- ①メテオ 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①ピラクロン 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ②ショキニー ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ③ウィナー 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③コメット 1キロ粒・顆粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ボデーガード 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ

前年一発剤のみで多発生したほ場

- ①ソルネット 1キロ粒
- ①メテオ 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①ピラクロン 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ③ウィナー 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③コメット 1キロ粒・顆粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ボデーガード 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ

【初期剤＋中期剤】

広葉・高葉等の雑草が多発生するほ場は体系処理で対応

- ①ソルネット 1キロ粒
- ①メテオ 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①ピラクロン 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ②ショキニー ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①ソルネット 1キロ粒
- ①メテオ 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①ピラクロン 1キロ・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ③ナイスミドル 1キロ粒（※イネが4葉期以降～）

台風被害による漏生籾対策

【初期剤＋一発剤＋（中期剤）】

昨年脱粒した籾が発生し異品種混入の原因とならないようにする。

- ①ソルネット 1キロ粒
- ①ソルネット 1キロ粒
- ②ボデーガード 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ヤイバ 1キロ粒・豆つぶ ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ボデーガード 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ②ヤイバ 1キロ粒・豆つぶ ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- 《※ナイスミドル1キロ粒（収穫60日前まで）》

※田植移植前に除草剤を使用する場合は、7日前までに行いましょう。

＜直播水稲＞

代かき　播種　出芽揃期　イネ1葉期　イネ1.5葉期

【初期剤＋一発剤】

- ②プレキープ 1キロ粒 ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
- ①サンバード 1キロ粒
- ②ザンテツ 1キロ粒
- ③ウィナー 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ
- ③ベンケイ 1キロ粒
- ②ボデーガード 1キロ粒・ﾌﾛｱﾌﾞﾙ・ｼﾞｬﾝﾎﾞ

※播種時の代が柔らかすぎる場合は播種同時散布は行わない。

〈農薬使用上の注意事項〉 農薬の容器や包装ラベルに記載された「適用作物」「使用量・濃度」「使用時期」「使用回数」と「使用方法」を必ず使用前に一読し、適正に使用しましょう。

◎水田にたっぷり水を入れ散布し、処理後は落水・掛け流しをしない。

・薬剤処理前にはネズミ穴などないように畦畔を補修し、水尻もしっかり止め、たっぷりの水（4～6cm）を保って散布します。湛水を維持しながら田面水を外に出さないような水管理を行って下さい。
また散布後は7日間は止水し、落水・かけ流しを避けて下さい。処理層をきっちり形成し、雑草に薬剤成分をうまく吸収させる為です。