

# 水稲除草剤の散布体系(例)


(※○数字は農薬成分数です)

代かき後	-7日	田植移植	+5日	+10日	+15日	+20日	+25日
<b>【一発除草剤】</b> ・水持ちの良い水田 ・一年生雑草から多年生雑草まで効く			③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ1キロ粒   ③ベンケイ豆つぶ・ジャンボ ③アツパレZ1キロ粒   ③アツパレZ フロアブル・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒   ③コメットフロアブル・ジャンボ ③カウントダウン1キロ粒・フロアブル・ジャンボ		※ベンケイ豆つぶ・ジャンボは +3日目から散布可能 ※アツパレZ フロアブル・ジャンボは +3日目から散布可能 ※コメットフロアブル・ジャンボは +5日目から散布可能		
<b>【初期剤+一発剤】</b> ・水持ちの悪い水田 ・多年生雑草の多い水田 ・前年に一発剤のみで多発生したほ場	※田植移植前に除草剤を使用する場合は、7日前までに行いましょう。 ①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ1キロ粒・フロアブル ①ピラクロン1キロ・フロアブル	①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ①ピラクロン1キロ・フロアブル・ジャンボ ②ショキニー1キロ・フロアブル・豆つぶ	③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ ③アツパレZ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒・フロアブル・ジャンボ ③カウントダウン 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ		③ウィナー 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ ③アツパレZ 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③コメット 1キロ粒・顆粒・フロアブル・ジャンボ ③カウントダウン 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ		
<b>【初期剤+中期剤】</b> ・広葉・後発等の雑草が多発生するほ場は体系処理で対応		①ソルネット 1キロ粒 ①メテオ1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ①ピラクロン1キロ・フロアブル・ジャンボ ②ショキニー1キロ・フロアブル・豆つぶ			③イツソウ 1キロ粒 ③ナイスミドル 1キロ粒(※イネが4葉期以降～) ②ワイドショット 1キロ粒		
<b>【雑草イネ・漏生初対策】</b> ・前作と異なる品種を作付けるほ場		①ソルネット 1キロ粒 ①エリジャン 乳剤・ジャンボ		③ベンケイ 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ ③カウントダウン 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③シグナス 1キロ粒・フロアブル・ジャンボ ③ベッカク 1キロ粒・豆つぶ・ジャンボ		③ナイスミドル 1キロ粒	

※減農薬栽培に取り組む方は、各方針作成者へお問い合わせください。 ※藻・アオミドロ・表層はく離があるほ場では、フロアブル、ジャンボ、豆つぶ剤は薬害が発生しやすいので注意する。

**【農薬使用上の注意事項】 農薬の容器や包装ラベルに記載された「適用作物」「使用量・濃度」「使用時期」「使用回数」と「使用方法」を必ず使用前に一読し、適正に使用しましょう。**

- ◎健苗を均平なほ場に植え、土壌条件や水持ちに応じた除草剤を選択し、異常高・低温時には使用を避け均一に散布し薬害の発生を防止しましょう。
- ◎雑草は代かき時から発芽・生長し始めます。除草剤の効果がある時期を逃さないように適期に散布しましょう。
- ◎水田にたっぷり水を入れ散布し、処理後は落水・掛け流しをしないようにしましょう。
  - ・薬剤処理前にはネズミ穴などないように畦畔を補修し、水尻もしっかり止め、たっぷりの水(4~6cm)を保って散布し湛水を維持しながら田面水を外に出さないような水管理を行ってください。また散布後は7日間は止水し、落水・かけ流しを避けてください。処理層をきっちり形成し、雑草に薬剤成分をうまく吸収させるためです。



**トラクターの公道走行はクリーンなタイヤで**  
 ほ場から出るときは、タイヤ及びクローラの土を  
 しっかり落としてから公道に出ましょう。

**阿賀野市のホームページからもご覧いただけます!**

阿賀野市 農業技術情報 検索

問い合わせ: 0250-61-2478

もしくは、二次元コードを読み取ってください。